

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1962

THÈSE

N°

1005

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DIPLOME D'ÉTAT

PAR

Claude, Gladie BEIGBEDER née LARAGE

née le 14 mars 1933 à Vincennes

Présentée et soutenue publiquement le :

BILAN DE CINQ ANNEES D'ELEVAGE DE PREMATURES

A L'HOPITAL DE FONTAINEBLEAU

Président : Mr M. LELONG, Professeur.

EDITIONS A. G. E. M. P. — 8, RUE DANTE - PARIS-V^e

1871

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1962

THÈSE

N°

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE


DIPLOME D'ÉTAT

PAR

Claude, Gladie BEIGBEDER née LARAGE

née le 14 mars 1933 à Vincennes

Présentée et soutenue publiquement le :



BILAN DE CINQ ANNEES D'ELEVAGE DE PREMATURES

A L'HOPITAL DE FONTAINEBLEAU

Président : Mr M. LELONG, Professeur.

EDITIONS A. G. E. M. P. — 8, RUE DANTE . PARIS-V^e

JACQUES DE MONTMAYE DE PARIS

THÈSE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER. DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.



CHAPITRE DEUXIÈME. DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

CHAPITRE TROISIÈME. DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. Alajouanine (T.), Aubin (A.), Bénard (H.), Bulliard (H.), Cadenat (F.), Chabrol (E.), Champy (C.), Debré (R.), Fey (B.), Gastinel (P.), Halphen (E.), Hazard (R.), Heuyer (G.), Lantuejoul (P.), Laroche (G.), Lévy-Solal (E.), Lian (C.), Mathieu (P.), Mocquot (P.), Mondor (H.), Monod (R.), Moreau (R.), Moulonguet (P.), Olivier (E.), Pasteur Valléry-Radot, Petit-Dutaillis (D), Quénu (J.), Richet (C.), Senèque (J.), Strohl (A.), Tanon (L.).

DOYEN Léon BINET.

Membre de l'Institut

1^{er} ASSESSEUR Jean VERNE

2^e ASSESSEUR Gaston CORDIER

I. — PROFESSEURS

1^{re} CHAIRES DE SCIENCES FONDAMENTALES

a) Professeurs titulaires :

MM.

Anatomie	DELMAS (A.)
Anatomie pathologique	DELARUE (J.)
Anesthésiologie	BAUMANN (J.)
Biochimie médicale	{ JAYLE (M.-F.)
	{ SCHAPIRA (G.)
Biologie appliquée à l'Education physique et aux Sports	CHAILLEY-BERT (P.)
Biologie médicale	FAUVERT (R.)
Cancérologie médicale et sociale	BERNARD (J.)
Embryologie	GIROUD (A.)
Histoire de la médecine et de la chirurgie (Lariboisière)	N...
Histologie	VERNE (J.)
Hygiène et médecine préventive	JOANNON (P.)
Médecine du Travail	DESOLLE (H.)
Médecine légale	PIEDELIEVRE (R.)
Microbiologie (Bactériologie et virologie)	FASQUELLE (R.)
Parasitologie	GALLIARD (H.)
Pathologie chirurgicale	HUGUIER (J.)
Pathologie exotique	LAVIER (G.)
Pathologie expérimentale et comparée	MERKLEN (F.-P.)
Pathologie médicale	MILLIEZ (P.)
Pathologie respiratoire	TURIAF (J.)
Pathologie et thérapeutique générales	BOUDIN (G.)
Pharmacologie	CHEYMOL (J.)
Physiologie	{ BINET (L.)
	{ BARGETON (D.)
Physiologie et pathologie obstétricale	LEPAGE (F.)
Physique médicale	{ DOGNON (A.)
	{ DJOURNO (A.)
Radiologie médicale	DESGREZ (H.)
Technique chirurgicale et Chirurgie expérimentale	N...
Thérapeutique	CONTE (M.)

b) Professeurs à titre personnel :

Biochimie médicale	{ DESGREZ (P.)
	{ POLONOVSKI (J.)
Biologie médicale	BOURLIÈRE (F.)
Embryologie	TUCHMANN (H.)
Hygiène et médecine préventive	DEPARIS (M.)
Parasitologie	BRUMPT (L.-G.)
Pathologie chirurgicale	LAURENCE (G.)
Pharmacologie	LÉVY (M ^{lle} J.)
Physiologie	PARROT (J.)

2^e CHAIRES DE SCIENCES CLINIQUES

a) Professeurs titulaires :

MM.

Clinique carcinologique chirurgicale (Necker)		REDON (H.)
Clinique cardiologique (Broussais)		MOUQUIN (M.)
	Beaujon	LORTAT-JACOB (J.-L.)
	Cochin	LEGER (L.)
Cliniques chirurgicales	Hôtel-Dieu	PATEL (J.)
	Pitié	CORDIER (G.)
	Saint-Antoine	GOSSET (J.)
	Salpêtrière	SICARD (A.)
	Tenon	OLIVIER (Cl.)
Clinique de chirurgie infantile et orthopédique (Enfants Malades)		FÈVRE (M.)
Clinique chirurgicale orthopédique et réparatrice (Cochin)		MERLE d'AUBIGNÉ (R.)
Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (Broussais)		GAUDART d'ALLAINES (F. de)
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire (Laennec)		MATHEY (J.)
Clinique endocrinologique (Pitié)		DECOURT (J.)
Clinique de Génétique médicale (Enfants-Malades)		LAMY (M.)
Clinique gynécologique (Broca)		FUNCK-BRENTANO (P.)
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Saint-Louis)		DEGOS (R.)
Clinique des maladies des Enfants (Enfants-Malades)		CATHALA (J.)
Clinique des maladies infectieuses (Claude-Bernard)		MOLLARET (P.)
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Sainte-Anne)		DELAY (J.)
Clinique des maladies métaboliques (Necker)		HAMBURGER (J.)
Clinique des maladies du sang (Broussais)		MARCHAL (G.)
Clinique des maladies du système nerveux (Salpêtrière)		CASTAIGNE (P.)
	Boucicaut	LENÈGRE (J.)
	Broussais	SOULIÉ (P.)
Cliniques médicales	Cochin	JUSTIN-BESANÇON (L.)
	Cochin	BROUET (G.)
	Hôtel-Dieu	BARIÉTY (M.)
	Lariboisière	SÈZE (S. de)
	Pitié	DREYFUS (G.)
	Saint-Antoine	KOURILSKY (R.)
Clinique médicale d'hydrologie thérapeutique et climatologie (Bichat)		DEBRAY (C.)
Clinique médicale propédeutique (Broussais)		GENNES (L. de)
Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition (Hôtel-Dieu)		
Clinique de neuro-chirurgie (Pitié)		DEROT (M.)
Clinique neurologique (Salpêtrière)		DAVID (M.)
		GARGIN (R.)
Cliniques obstétricales	Baudelocque	LACOMME (M.)
	Foch (Suresnes)	MERGER (R.)
Clinique obstétricale et gynécologique (Port-Royal)		VARANGOT (J.)
Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu)		RENARD (G.)
Clinique oto-rhino-laryngologique (Lariboisière)		AUBRY (M.)
Clinique de pédiatrie et de puériculture (Saint-Vincent-de-Paul)		LELONG (M.)
Clinique de pédiatrie sociale (Enfants-Malades)		MARIE (J.)
Clinique de pneumo-phtisiologie (Laennec)		BERNARD (E.)
Clinique de neuro-psychiatrie infantile (Salpêtrière)		MICHAUX (L.)
Clinique de rhumatologie médicale et sociale (Cochin)		COSTE (F.)
Clinique stomatologique (Pitié)		DECHAUME (M.)
Clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugirard)		ROUX (M.)
Clinique thérapeutique médicale (Saint-Antoine)		LEMAIRE (A.)
Clinique toxicologique		GAULTIER (M.)
Clinique traumatologique		PADOVANI (P.)
Séméiologie médicale		DOMART (A.)
Séméiologie et clinique chirurgicales		POILLEUX (F.)
Clinique urologique (Necker)		COUVELAIRE (R.)
Hygiène et clinique de la première enfance (Trousseau)		TURPIN (R.)

b) Professeurs à titre personnel :

Médecine	BOUR (H.)
	LHERMITTE (F.)
	PEQUIGNOT (H.)

II. — PROFESSEURS SANS CHAIRE, PROFESSEURS AGRÉGÉS ET MAÎTRES DE CONFÉRENCES - AGRÉGÉS

	MM.		MM.
Anatomie	CABROL (C.) COUINAUD (C.) GILLOT (G.) OLIVIER (G.) GAUTHIER-VILLARS (Mlle P.) pr. s. ch.	Orthopédie	JUDET (R.) MEARY (R.) POSTEL (M.) RAMADIER (J.)
Anatomie pathologique	ABELANET (R.) BUSSET (F.) CHOMETTE (G.) GOUYGOU (Ch.), m. conf. NEZELOFF (Ch.) ORCEL (L.) PAILLAS (J.)	Oto-rhino-Laryngologie	DEBAIN (J.) PIALOUX (P.)
Anesthésiologie	KERN (E.) VOURC'H (G.)	Parasitologie	GOLVAN (Y.) LAPIERRE (J.)
Bactériologie	BARBIER (P.) CHRISTOL (D.) LE MINOR (L.) TOURNIER (P.)	Pathologie chirurgicale	BARCAT (J.) BINET (J.-P.) CAUCHOIX (J.) GERBONNET (G.) CHATELIN (C.-L.) DUBOST (Ch.) DUBOST (Cl.) FAUREL (J.) FLABEAU (F.) GARBAY (M.) GARNIER (H.) (Cl. de) GAUDART-d'ALLAINES
Biochimie médicale	BAILLIEU El. m. conf. BOURILLON (R.) CARTIER (P.) DREYFUS (J.-Cl.) GONNARD (P.) KRUH (J.) JEROME (H.)	Pathologie exotique	SCHNEIDER (J.) BENHAMOU (J.-P.) BERTHAUX (P.) BOIVIN (P.) CROSNIER (J.) HARTMANN (L.) LÉPER (J.) MAURICE (J.) MIKOL (Cl.) RICHET (G.)
Biologie appliquée à l'Éducation Physique et aux Sports	PLAS (F.)	Pathologie expérimentale	AUSSANNAIRE (M.) BOUVIER (J.) BOUVRAIN (Y.) BRICAIRE (H.) BRISSAUD (H.) BROCARD (H.) BUGÉ (A.) CATINAT (J.) CHRÉTIEN (J.) COBLENTZ (B.) CONTAMIN (F.) COURY (C.) ÉTIENNE (J.-P.) FREZAL (J.) FRITEL (D.) HENNEQUET (A.) HIMBERT (J.) HOUSSET (E.) LAROCHE (Cl.) LESOBRE (R.) MAGREZ (C.) MOREAU (L.) NICK (J.) ROYER (P.) TOURNEUR (R.) WOLFROMM (R.)
Carcinologie	BOIRON (M.) DENOIX (P.) MATHE (G.) SELIGMANN (M.)	Pathologie médicale	JOSEPH (R.) LAFOURCADE (J.) LEPERCO (G.) MANDE (R.) MOZZICONACCI (P.) POLONOVSKI (C.) ROSSIER (A.) VIALATTE (J.)
Dermato-Syphiligraphie	GIVATTE (J.) DUPERRAT (B.)		
Electro-Radiologie	LEDoux-LEBARD (G.)		
Hématologie	BESSIS (M.) BILSKI-PASQUIER (G.) DAUSSET (J.) DUHAMEL (G.)		
Histologie	COUJARD (R.), pr. s. ch. MAROIS (M.) RACADOT (J.)		
Hydrologie	BESANÇON (F.) CORNET (A.)		
Hygiène	BOYER (J.) pr. s. ch. BLANCHER (G.) CORRE-HURST (Mme L.) SAPIN-JALOUSTRE (H.)		
Maladies infectieuses	BASTIN (R.) DUPONT (V.)		
Médecine légale	DEROBERT (L.), pr. s. ch. FOURNIER (E.) GUENIOT (M.) HADENGUE (A.)		
Médecine du travail	ALBAHARY (C.)		
Neuro-chirurgie	PERTUISSET (B.)		
Obstétrique	GRANJON (A.) HERVET (E.) LE LORIER (G.) LEVY (J.) MORIN (P.) MUSSET (R.) ROBÉY (M.) SENEZE (J.) SUREAU (C.) THOYER-ROZAT (J.)		
Ophtalmologie	BRÉGEAT (P.) DUBOIS (A.) SARAUX (H.)		

	MM.
Pharmacologie	BOISSIER (J.) LECHAT (P.) BARRES (G.) DEJOURS (P.) DURAND (J.)
Physiologie	GIRARD m. conf. HUGELIN (A.) SCHERRER (J.) CHANTEUR (J.) DOUGEROT (L.), m. conf. pr. s. ch.
Physique médicale	GREMY (F.) m. conf. MILHAUD (G.) PELLERIN (P.) ROUCAYROL (J.-Cl) TUBIANA (M.) m. conf.
Pneumo phtisiologie	KREIS (B.) MEYER (A.) RENAULT (P.)

	MM.
Psychiatrie	PICHOT (P.)
Psychiatrie infantile	DENIKER (P.) DUCHE (D.) FLAVIGNY (H.) LAPRESLE (J.)
Rhumatologie	DELBARRE (F.)
Stomatologie	CERNEA (P.) CHAPUT (M ^{me} A.) m. c. agr. GRELLET (M.)
Thérapeutique	CHASSAGNE (P.) LAMOTTE (M.) MARCHÉ (J.)
Urologie	AUVERT (J.) MOULONGUET (A.) QUENU (L.)

III. — PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGRÉGÉS CHARGÉS DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE à titre permanent.

	MM.
Anatomie	DEBEYRE (J.)
Clinique chirurgicale	ABOULKER (P.) AMELINE (A), pr. s. ch. VERNE (J.-M.)
Clinique médicale	PERRAULT (M.) RAMBERT (P.) THIEFFRY (S.)
Clinique obstétricale	GRASSET (J.) MAYER (M.)

	MM.
Clinique ophtalmologique	DESIGNES (P.) OFFRET (G.)
Clinique oto-rhino-laryngo- logique	MADURO (R.)
Clinique pédiatrique et pué- riculture	LAPLANE (R.)
Clinique psychiatrique	BARUK (H.)
Clinique urologique	KUSS (R.)

IV. — PROFESSEURS DÉTACHÉS DANS LES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

Bactériologie	HAUDUROY (P.) Pr. s. ch.
Pathologie chirurgicale	RUDLER (J.) Pr. s. ch.

V. - CHARGÉS DE COURS D'HYGIÈNE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Secrétaire général de la Faculté	M. LENA (J.)
Secrétaire principal	Mlle CHAINTREUIL (G.)
Conservateur en Chef de la Bibliothèque	
Conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine	M. le Docteur HAHN (A.)
Conservateur	Mlle DUMAITRE (P.)
Bibliothécaires	Mmes CONTET (J.), FORGET (F.), Milles LAURENT (H.), LE NOIR (G.), QUIÉVREUX (E.)

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A ma mère,

à qui je dois tout

A mon mari,

A mon fils

A ma famille

A mes amis

Digitized by the Internet Archive
in 2026

A mon Président de Thèse Monsieur le Professeur Marcel LELONG

Titulaire de la Chaire de Puériculture de la Faculté
de Médecine de Paris

Médecin de l'Hôpital Saint Vincent de Paul

Officier de la Légion d'Honneur

qui a bien voulu nous faire l'honneur
de présider cette thèse.

En hommage respectueux.

A mon Maître Monsieur le Professeur Agrégé A. ROSSIER

qui nous a guidé avec bienveillance
dans ce travail.

Notre respectueuse gratitude.

A Monsieur le Docteur MERCIÉ

Chef du Service de Pédiatrie de l'Hôpital de
Fontainebleau

A qui je suis heureuse de témoigner toute
ma reconnaissance pour les 6 mois de tra-
vail accomplis sous sa bienveillante
direction.

A Monsieur le Docteur Jean FUMERY

avec toute ma gratitude pour l'enseignement dont il m'a fait bénéficier pendant 2 ans.

A MES MAÎTRES DES HÔPITAUX

EXTERNAT

Monsieur le Professeur G. MENEGAUX, in memoriam

Monsieur le Professeur BROCARD

Monsieur le Professeur DEPARIS

Monsieur le Docteur MOUSSOIR

I N T R O D U C T I O N

Nous ne voulons pas dans ce travail apporter des données nouvelles sur l'élevage des prématurés. En France des travaux de M. LELONG, A. ROSEIER et de leurs collaborateurs ont permis de codifier les grandes règles qui doivent présider à la création et au fonctionnement des centres modernes de prématurés, avec leur exigences en locaux, en matériel et en personnel hautement spécialisé.

La prévention de la mortalité néo-natale est un des buts principaux du pédiatre.

Comme l'écrit le Professeur Marcel LELONG :

" les grandes tueuses de nouveau-né sont :

- les hémorragies intra-crâniennes
- l'asphyxie
- l'infection
- les malformations congénitales.

la prématurité, seule ou associée à l'une de ces 4 grandes causes, explique près de la moitié des décès du 1er mois".

Notre but est d'apporter un témoignage au sujet de l'annexe des prématurés du service de Pédiatrie de l'Hôpital de Fontainebleau. Nous

montrerons comment ce service non conçu au départ pour un tel usage a dû rapidement faire face à une demande qui allait s'accroissant. Cela implique un agrandissement tout d'abord puis un aménagement des locaux de façon à ce qu'ils puissent correspondre grossièrement aux normes requises par l'élevage de ces prématurés.

Deux étapes fondamentales dans cette histoire :

- d'abord l'isolement d'une certaine surface du reste du service de pédiatrie,
- ensuite la décision de créer prochainement un centre de prématurés tout à fait indépendant du service dont les plans sont faits mais dont la construction est retardée.

La description des moyens utilisés montrera une adaptation quasi permanente à des situations nouvelles. De nombreuses difficultés ont été affrontées , beaucoup ont été résolues rationnellement, pour d'autres il a fallu se résoudre à de l'"à peu près".

Nous ne saurions trop insister sur le dévouement du personnel attaché aux prématurés et reconnaître avec Monsieur le Professeur LELONG que "la compétence, la conscience, le dévouement du personnel importent plus pour le succès d'un service que l'équipement matériel".

Au cours de notre stage d'externe chez M. le Pr. Agrégé ROSSIER nous avons été initiée à l'examen; à la manipulation et aux soins des petits prématurés, qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour toute la bienveillance qu'il m'a témoignée.

Notre séjour chez M. le Dr. MERCIÉ en tant qu'interne , nous a permis, en bénéficiant de son expérience et sous sa sage et bienveillante direction, de nous intéresser et de faire face aux petits problèmes quotidiens de l'élevage des prématurés.

Nous tenons à exprimer à Monsieur le Professeur LELONG qui nous fait l'honneur d'accepter la présence de cette thèse, nos sentiments très respectueux.

oOo

- I -

LES EXIGENCES PARTICULIERES DES PREMATURES

DEFINITION DU PREMATURE :

Nous adopterons celle définie par l'OMS " est considéré prématuré tout enfant né vivant avec un poids à la naissance de 2.500 g ou moins".

Mais tous ces prématurés ne présentent certes pas les mêmes difficultés d'élevage et si les enfants de 1.800 g et plus peuvent être élevés dans des conditions presque normales, les prématurés d'un poids inférieur nécessitent des soins tout à fait particuliers.

Cet élevage repose donc sur la connaissance de la physiologie du prématuré. "Ce qui définit le prématuré : c'est moins son âge foetal, son poids ou sa taille, que l'imperfection de ses organes et l'immaturité de ses grandes fonctions physiologiques" (Professeur A. ROSSIER).

RAPPEL PHYSIO-PATHOLOGIQUE :

I - LA RESPIRATION

Il existe une immaturation du centre respiratoire entraînant un rythme périodique . avec apnée régulière, une insuffisance des muscles respiratoires de la cage thoracique avec un diaphragme seul efficace et des poumons qui chez le "prématurisme " n'ont pas encore acquis une structure alvéolaire mais canalaire d'où inaptitude au moins partielle à une hématoxe correcte.

Le prématuré est donc pratiquement en état d'anoxémie , le taux d'oxygène dans les poumons est faible et cela d'autant plus que l'enfant est petit.

II - LA REGULATION THERMIQUE

Lors de la naissance le prématuré passe de la température de l'utérus maternel à celle de l'atmosphère ambiante ; il se produit pendant la 1ère heure une chute de 2 à 3 degrés, et si le prématuré n'est pas placé en atmosphère chauffée, il s'installe une hypothermie qui peut devenir rapidement mortelle si elle se prolonge. Cette hypothermie a pour conséquence une dépression du centre respiratoire avec ralentissement circulatoire, d'où une aggravation de l'anoxie.

Le centre thermo-régulateur est immature, la thermogénèse est faible, la thermolyse est grande en raison des pertes élevées par rayonnement :

- grande surface du prématuré par rapport à son poids
- absence de pannicule adipeux sous-cutané

III - L'IMMATURITE DES FONCTIONS DIGESTIVES

L'alimentation est entravée par des insuffisances mécaniques, la succion n'existe pas encore ou est inefficace, l'incoordination des mouvements de déglutition peut être à l'origine de fausses routes, la capacité gastrique est très réduite. L'immaturité digestive se traduit encore par une insuffisance des fonctions sécrétoires, en particulier de l'amylase et de la lipase pancréatiques.

Le réchauffement en incubateur évitant la déperdition calorifique par rayonnement, permet de réduire la ration calorique et ainsi de donner un régime moins riche, mieux supporté par le prématuré.

Au point de vue qualitatif, l'apport protéidique nécessaire est de 4 à 5 g/kg au lieu de 3 g. chez le nourrisson normal.

L'apport lipidique est faible car la digestion des graisses est très imparfaite.

L'apport glucidique fournit l'appoint calorique nécessaire. L'alimentation doit être riche en sels minéraux car le prématuré en est pauvre, l'apport maternel important des derniers mois de la gestation lui ayant été retiré. Un apport régulier de fer pourra prévenir une anémie tardive.

L'alimentation doit apporter au prématuré des vitamines A et D, par sa croissance rapide il est en effet particulièrement exposé au rachitisme.

IV - L'IMMATURATION VASCULAIRE

Elle entraîne la fragilité capillaire : structure vasculaire inachevée et perméabilité capillaire sont à l'origine d'hémorragies cérébro-méningées que le traumatisme obstétrical ne peut pas toujours expliquer.

V - LA RECEPTIVITE A L'INFECTION

Chez le prématuré, l'infection est extrêmement grave en raison de ses moyens de défense réduits.

L'infection peut exister déjà in utéro , mais elle est surtout apportée dès le premier contact avec l'extérieur, la plaie ombilicale, la peau, les muqueuses, lui sont autant de portes ouvertes.

La prophylaxie de l'infection doit être la hantise de tout élevage de prématurés et tout doit concourir dans ce but, locaux, matériel, discipline du personnel infirmier et médical.

- II -

HISTORIQUE DU CENTRE DE PREMATURES DE L'HOPITAL DE FONTAINEBLEAU

Jusqu'en 1949, les enfants prématurés de la région étaient traités tant bien que mal à domicile ou dirigés vers les services parisiens.

Dans les années qui suivirent, les médecins et les maternités prirent l'habitude d'adresser tous les nouveaux-nés prématurés au service de pédiatrie de l'Hôpital. Ce service agissait à la fois comme centre de triage et comme centre de traitement. Il disposait d'un incubateur de marque française et de 2 ou 4 lits un peu à l'écart dans le service, ces derniers réservés aux prématurés de plus de 1.800 g.

Les "prématurissimes" étaient dirigés sur Paris mais ils devaient souvent attendre quelques jours avant d'avoir une place.

Les conditions d'isolement et d'asepsie étaient loin d'être réunies et l'on se contentait de cette solution provisoire en attendant la création d'un véritable centre de prématurés.

Vers la fin de 1949, un incident se produisit qui décida le Dr. MERCIER, chef du service de Pédiatrie à abandonner l'élevage des prématurés dans ces conditions. Pendant les années 1950 à 1954, quelques prématurés furent pris en charge mais il s'agissait d'enfants de poids supérieur à 1.800 g. dont l'état ne nécessitait pas de soins très spéciaux.

En 1954, le service de pédiatrie fut installé dans des locaux plus spacieux et plus adaptés au traitement des enfants. Sur les insistentes des médecins régionaux, l'élevage des prématurés fut à nouveau entrepris.

Les conditions de cet élevage étaient loin d'être satisfaisantes. Les prématurés étaient isolés dans une pièce un peu à l'écart, orientés au nord où étaient disposés 2 incubateurs MMS et 3 lits. Il y avait un lavabo dans la pièce et pas de zone neutre pour les précautions d'asepsie élémentaires (lavage des mains, blouses).

Malheureusement, l'expérience devait montrer à quel point ces prématurés étaient exposés à l'infection.

En Avril 1954, sévissait en Pédiatrie une épidémie à colibacille IIIB₄. Malgré les précautions d'asepsie les plus rigoureuses utilisant les moyens dont on disposait, les 4 prématurés présents furent atteints et moururent en 24 heures.

L'élevage des prématurés fut alors une fois de plus interrompu, le Dr. MERCIÉ refusant les enfants jusqu'à ce que de nouvelles conditions soient réunies qui donneraient à cet élevage une possibilité d'être efficace.

En 1956, on isola à une extrémité du service ce qui est depuis la section des prématurés. Cette fois l'isolement était presque parfait, nous décrirons plus loin l'installation, mais restaient 2 problèmes qui n'ont pu être résolus:

- l'existence d'une bibéronnerie commune aux prématurés et au service de pédiatrie.
- l'absence de personnel autonome, la puéricultrice responsable des prématurés étant aussi utilisée pour le service de pédiatrie.

Malgré cela l'expérience a prouvé la valeur de cette section, 2 faits l'attestent :

Ce sont d'une part les statistiques données à la fin de cet ouvrage et qui peuvent être considérées comme satisfaisantes, d'autre part l'histoire d'une épidémie de crèche à colibacille pathogène.

Cette épidémie sévissait dans le service de pédiatrie, le germe en cause était un colibacille facilement identifiable, résistant à tous les antibiotiques sauf deux, colimycine et furadoïne. Il fallut 1 mois avant qu'un prématuré ne fut atteint. Par la suite ils le furent tous mais grâce à la thérapeutique un seul mourut, un mongolien dont l'avenir s'annonçait sombre.

Cette épidémie malgré tout impressionna suffisamment les autorités et la création d'un Centre de Prématurés fut décidée, centre tout à fait indépendant du Service de Pédiatrie et répondant enfin aux exigences d'un tel élevage. Ce centre est en cours de réalisation.

- III -

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE

I - LES LOCAUX

La section des prématurés est située à l'extrémité du service de pédiatrie et bénéficie ainsi d'un certain isolement. Elle comporte 3 pièces .

La première isole les 2 autres du couloir d'arrivée et présente les caractéristiques d'un sas . Elle comporte :

- un lavabo
- les blouses et les bavettes stériles
- une pharmacie contenant le matériel stérile
- un incubateur portatif
- une petite table avec les dossiers des enfants
- 3 portes vitrées, l'une donne accès dans le couloir d'arrivée, les 2 autres dans chacune des salles de prématurés.

Dans cette salle se font le lavage et brossage des mains, on y enfle obligatoirement une blouse et une bavette stériles.

Ensuite deux salles :

- l'une à gauche contient les 3 incubateurs MMS, un lavabo et tout le matériel individuel à chaque prématuré.
- à droite une pièce avec 4 lits réservés aux présortants, c'est à dire aux enfants sortis d'incubateurs. Là encore lavabo et matériel individuel.

Les fenêtres de ces 2 pièces sont orientées sud-est et bénéficient ainsi de l'ensoleillement.

Les visites ne sont pas admises à la section des prématurés, elles restent derrière la porte vitrée du sas et peuvent voir les enfants à travers la cloison vitrée à mi-hauteur de chaque salle.

Pour chaque enfant il existe une blouse enfilée par la puéricultrice au moment des soins. Toutes les manipulations se font à l'intérieur des incubateurs, toilette, change, repas, soins. La pesée est immédiate, l'incubateur comportant une balance, et température oxygène humidité sont réglables à volonté. L'enfant y repose nu, une simple couche sur les organes génitaux externes et la surveillance en est particulièrement facile à travers le plexiglas transparent.

Les incubateurs sont lavés chaque jour avec une solution d'ammonium quaternaire, le linge utilisé dans les incubateurs est stérile, le linge destiné aux présortants est lessivé et est commun au service de pédiatrie.

Le sol est lavé une fois par jour et 3 lampes germicides à ultra violet sont allumées 8 heures par jour.

La béréronnerie est commune avec le service de Pédiatrie et malheureusement dans l'état actuel pas d'autre solution ne peut être proposée. La béréronnerie est de plus assez rudimentaire et bien que les rations soient préparées avec le maximum d'exactitude et de soins, il n'existe pas de séparation entre l'endroit où se font les manipulations septiques, lavage et stérilisation, et la préparation des biberons. Tétines et sondes sont bouillies biberons et seringues sont stérilisées à l'autoclave avec ceux du service de Pédiatrie.

II - LE PERSONNEL

assurant le service comprend m

- le jour : deux puéricultrices diplômées d'état ayant fait ainsi un stage dans un service de prématurés, deux auxiliaires sans formation particu-

lière mais formées alors par les puéricultrices.

- la nuit, une seule auxiliaire s'occupe du service.

Malheureusement ce personnel n'est pas réservé à la section des prématurés et s'occupe également des enfants malades du service voisin.

III - PROVENANCE DES ENFANTS

Ils viennent pour une bonne part de la maternité de l'Hôpital et des cliniques privées de la ville, ces enfants bénéficient alors d'une liaison obstétrico-pédiatrique correcte. Ils viennent aussi d'autres hôpitaux, Monterau, Melun, des cliniques ouvertes de la région et enfin ils nous sont envoyés par le médecin traitant, l'accouchement ayant eu lieu à domicile.

Dans ce dernier cas, la liaison obstétrico-pédiatrique est souvent particulièrement mauvaise. L'enfant arrive au bout de plusieurs heures ou de plusieurs jours, les conditions de l'accouchement sont mal connues, le transport se fait avec des moyens rudimentaires et l'enfant arrive souvent dans un état pitoyable, emballé dans des langes et du coton.

En majorité, ces enfants viennent d'un milieu rural et l'éloignement posent souvent le problème de l'allaitement maternel. Enfin milieu de la batellerie, où sont souvent réunies toutes les mauvaises conditions de départ du prématuré, grossesse non ou mal surveillée, retard entre l'accouchement et l'appel du médecin, transport de l'enfant dans des langes.

IV - ADMISSION AU CENTRE

Est considéré comme entrant tout enfant qui franchit la porte de la section même s'il ne reste que quelques heures.

Quand nous sommes prévenus de la naissance d'un prématuré, l'incubateur portatif part en ambulance avec une puéricultrice chargée des premiers soins. A son arrivée l'enfant est placé en incubateur.

Il est manipulé le moins possible, avec le maximum de douceur et on ne lui fait pas de toilette. Il repose nu sur une couche stérile. Les observations concernant l'enfant sont notées sur un cahier individuel et 8, 10, 12 fois par jour selon le nombre de repas sont notés :

- le caractère des selles et des mictions
- le teint, la gestulation
- la façon dont l'enfant a pris son repas
- la température 3 fois par jour ou plus souvent si il y a instabilité thermique. Ce cahier est scrupuleusement tenu à jour et toute observation anormale est signalée au médecin par la puéricultrice.

Le réchauffement:

A l'arrivée de l'enfant la température de l'incubateur est réglée de façon variable, elle est fonction du poids de l'enfant:

- 36° - 37° de 1000 à 1400 g
- 34° - 35° de 1400 à 1700 g
- 32° - 34° de 1700 à 2000 g.

L'oxygénation :

Elle est systématique à l'arrivée mais rigoureusement contrôlée. Si tout est normal , on assure un débit de 2 litres arrêté au bout de quelques heures si l'enfant respire bien, n'est pas cyanosé. S'il est cyanosé, l'oxygène est poursuivi plus longtemps selon les besoins sans toutefois jamais dépasser 40%, puis diminué, donné par intermittences et enfin supprimé.

On maintient une humidité de 50 à 80%.

V - CONDUITE DE L'ALIMENTATION

La diète est complète pendant 36 ou 48 h. pour les faibles poids. Cet intervalle libre permet :

- d'évacuer les oedèmes infiltrant le tissu sous-cutané
- d'éviter l'effort digestif pendant la période critique où il s'agit surtout de faire respirer l'enfant.

Ce délai passé on commence l'alimentation.

Le nombre de repas :

est fonction du poids de l'enfant, en raison de la faible capacité gastrique :

- 8 repas à partir de 2 kg
- 10 repas jusqu'à 1300 - 1200 g
- 12 repas au-dessous de 1300 g.

Les repas sont donnés à intervalles réguliers.

Le gavage :

à la sonde molle passée par la bouche et systématique pour les enfants de moins de 1500 g. Les avantages sont multiples :

- absence de fatigue
- quantité absorbée parfaitement connue
- diminution du risque d'aspiration bronchique.

Vers 1500 g. le passage du biberon dépend des possibilités de succion, de toute façon il se fera de façon progressive.

Le problème du lait maternel :

Il ressort des travaux de l'Ecole de Puériculture que le lait maternel doit être l'aliment de base du prématuré.

Malheureusement peu de nos prématurés en bénéficient de façon permanente. En effet la maternité nous fournit un peu de lait de femme mais souvent de façon tansitoire car la jeune mère n'est pas une bonne nourrice. Et si, par chance, la mère peut nourrir son enfant, le service met à sa disposition une tireuse électrique à la sortie de la maternité. Le lait nous est

porté chaque jour mais très souvent l'éloignement, le manque de communications faciles ne permettent pas d'entreprendre ou de poursuivre cet allaitement.

Une autre solution serait d'utiliser du lait de femme sec venant du lactarium de Paris, mais la distance et le prix de revient ne laissent pas de réserve qu'à des cas exceptionnels.

Aliment utilisé :

En définitive nos prématurés sont élevés dans l'immense majorité des cas au lait sec demi-écrémé. C'est un excellent lait, riche en protéines, en sels minéraux Ca et P, de bonne digestibilité et de composition stable. Nous utilisons le lait Aleté.

L'alimentation est très progressive, on arrive à 100 g/Kg. vers le 10^e jour, de 150 à 200 g/Kg le 15^e jour.

Pour un enfant de 1500 g. à la naissance :

- au 3^e jour 10 x 5 g eau glucosée
- au 4^e jour 10 x 10 g. d'Aleté à 4%
- au 15^e jour 10 x 30 g d'Aleté à 15%,

en augmentant la ration de 5 g en 5 g, en même temps que la concentration du lait;

- à 1600 g 10 x 30 g Aleté 17%
- à 2000 g 8 x 50 g "
- 2500 g 6 x 100 g "

A partir du 8^e jour les vitamines sont introduites dans l'alimentation sous forme de polyvitamines =

- au-dessous de 2 kg 10 gouttes
- au-dessus 14 gouttes
- Vitamine C 0,25 g.

Courbes de poids :

Notre ration alimentaire ainsi calculée apporte au prématuré 150 calories par kilo et par jour. Elle assure une courbe de poids satisfaisante à des enfants dont le poids varie entre 1000 g et 2000 g.

Le poids de naissance est le plus souvent rattrapé en 15 à 20 jours, la courbe de poids est régulière et la prise quotidienne est en moyenne de 20 à 30 grammes.

L'enfant est sortant dès qu'il a atteint 3000 gr mais parfois avant quand le milieu familial peut assurer un élevage correct.

- IV -

SOINS SPECIAUX AUX PREMATURES

Les troubles respiratoires :

Ils occupent la première place par ordre de fréquence dans la pathologie du prématuré.

L'observation de la respiration est aisée sur l'enfant nu, à travers le plexiglass de l'incubateur. La cyanose existe souvent mais aux extrémités elle est banale. Les mouvements de la cage thoracique sont facilités par la surélévation légère des épaules.

En cas d'obstruction avec rejet de mucosités par les lèvres et le nez, respiration bruyante avec gros râles à l'auscultation pulmonaire, on pratique une désobstruction à l'aide d'une sonde, molle, branchée à un aspirateur électrique.

Les apnées sont particulièrement inquiétantes quand elles s'accompagnent de cyanose. Un traitement comprend :

- une injection d'un mélange associant camphré, caféine et lobeline
- une oxygénation accrue
- la respiration artificielle, en faisant des pressions rythmiques douces sur le bas du thorax saisi entre le pouce et les autres doigts.

- 2 à 3 gouttes de cognac déposées sur la langue , le plus souvent on assiste à une reprise des mouvements respiratoires, mais la surveillance est constante car la récédive est de règle avec le risque de mort.

L'injection d'une demi ampoule de vitamine K, associée à de l'adrénosyl n'est pas systématique mais très fréquente, en particulier en cas de troubles respiratoires et à plus forte raison s'il existe la moindre manifestation hémorragique.

Les troubles nerveux :

Ils se manifestent le plus souvent par des troubles respiratoires auxquels s'associent :

- des troubles du tonus, c'est le plus souvent une hypotonie, impressionnante faisant de l'enfant une véritable "poupée de chiffons".
- des crises convulsives toniques ou cloniques généralisées ou localisées,
- l'absence de réflexes archaïques,
- l'absence de cri franc remplacé par un gémissement plaintif monotone
- une agitation extrême ou de la somnolence.

La ponction lombaire est systématique, faisant le plus souvent la preuve de l'hémorragie méningée en ramenant liquide hypertendu sanglant dans plusieurs tubes .

Outre l'oxygénothérapie, les coagulants, le gardénal à la dose de 1 à 2 cg en cas de convulsions, on injecte en cas d'hémorragie méningée, $\frac{4}{10}$ de cc d'hydrocortisone intra-rachidien. Nous verrons plus loin l'observation d'un enfant véritablement réssucité par cette thérapeutique.

L'infection du prématuré :

L'indication des antibiotiques est très large, le plus souvent pénicilline, en particulier en cas de liquide méconial, d'appatation bronchique, de régurgitations, de retard à l'admission. Malheureusement nous ne

disposons pas de chambre d'isolement pour les enfants, hospitalisés tardivement et considérés comme infectés.

En cas d'épidémie de crèche, il n'y a donc pas d'isolement possible, seule est instituée une antibiothérapie appropriée de façon prophylactique. La perfusion intra-veineuse s'impose lors des cas de déshydratation avec vomissements et diarrhées. Il n'y a jamais de dénudation veineuse grâce à l'habileté de la religieuse surveillante du service qui installe pour 48 heures une perfusion par ponction veineuse à l'aide d'une aiguille épicranienne.

L'anémie du prématuré :

La surveillance de la formule sanguine est de règle. L'anémie du prématuré est très fréquente, expliquée en partie par les besoins d'une croissance rapide que les organes hématopoïétiques ne peuvent entièrement satisfaire. Cliniquement l'anémie se traduit par la pâleur des conjonctives et une courbe de poids stationnaire.

La numération montre une anémie normochrome, dont le chiffre moyen est de l'ordre de 2.500.000 GR avec une hémoglobine à 56%.

De petites transfusions, 15 à 20 cc selon le poids de l'enfant deux à quatre selon la formule sanguine, réparent l'anémie et ont une influence heureuse sur l'état général.

- V -

PATHOLOGIE DU PREMATURE

Nous allons insister maintenant sur quelques observations illustrant certaines des difficultés rencontrées dans les premiers jours.

OBSERVATION N° I

L'ictère du prématuré dit physiologique est très fréquent. L'hémolyse néo-natale libère de l'hémoglobine qui reste en partie à l'état indirect, le foie non encore mature ne pouvant la transformer entièrement en bilirubine directe.

Cet ictère début vers le 2^e jour, est maximum le 5-6^e jour et disparaît au 8-10^e jour. L'évolution le plus souvent bénigne peut être mortelle, quand la bilirubine atteint 250 mg/litre, seuil dangereux à partir duquel l'ictère nucléaire est à redouter.

M. ALAIN - 30.12.59 - terme 8 mois, accouchement normal - mère 25 ans - 3^e pare.

le 31.12 : ictère débutant

le 2.1 : boit très mal, régurgitations importantes, respiration irrégulière et superficielle avec apnée, réflexes archaïques présents - ictère foncé sans hépato-splénomégalie.

Le 5.I. : enfant 0 + mère B rh +
bilirubine indirecte 260 mg/litre

Le 7.I : bilirubine indirecte 220 mg/litre - enfant moins hypotonique
urines et selles normalement colorées.

Le 16.2. : poids 3330 J. va très bien.

OBSERVATION N° 2

Ictère mortel par incompatibilité A-O.

B... Jean-Michel, né le 23.2.60 , II45 g, terme 6 mois, accouchement
normal par le siège, cri immédiat, A l'entrée, gémit, petite hémorragie par
le cordon.

Le 24. : début de l'ictère

Le 27 .: poids 840 g. apparition brusque de l'ictère - bilirubine indi-
recte 565 mg/litre - la mère est 0+ l'enfant A+

Le 28 .: décès.

OBSERVATION N° 3

Hémorragie méningée traitée avec succès par l'injection d'hydrocor-
tisine intra-rachidienne.

L... Jean-Michel né le 8.II.58, 2050 g terme de 7 mois, mère 6è pare,
tête bloquée par spasme du col, spasmalgine et post hypophyse IM. Cri au bout
de quelques minutes. légère cyanose qui devient très marquée au bout de quelques
heures, périodes d'apnée, I/2 vitamine K1

Le 10.II.: sclérème , hématomes, rejet de sang par le nez, état de
mort apparante, enfant cireux, la PL ramène un liquide très xanthochromique,

on injecte localement 7,5 mg d'hydrocortisone, et 5 mg de cortisone IM.
aussitôt après reprise d'un rythme respiratoire normal :

Le 11. : l'amélioration persiste,

Le 12. : enfant un peu agité

Le 14. : PL - le liquide coule plus lentement - albumine 1,20 g

Le 15. : respiration normale , mais inertie et absence de
réflexes archaïques.

Le 18.12 : mouvements de succion , ébauche de Moro

Le 16.12 : hypotonie très marquée, pauses respiratoires

Ponction lombaire, LCR 0,50 g d'albumine

Le 20.12 : va bien, découverte d'un souffle systolique intense
para-sternal gauche.

A sa sortie du service va bien.

Revu plus tard, il existe un retard psycho-moteur.

OBSERVATION N° 4

"Ulcération pariétale" du cuir chevelu. 1er cas qu'il nous ait été
donné de voir dans le service.

B... Claudie née le 27.12.61, 1600 g accouchement normal au terme
de 6 mois 1/2. Bon aspect à l'entrée.

Au 11^e jour, poids stationnaire - enfant très agitée, apparition,
spontanément , au niveau de la suture temporo-frontale droite très saillante
d'une tuméfaction rouge faisant place le lendemain à une large phlyctène à
contenu séro-sanglant. L'ouverture spontanée laisse une ulcération en cratère -
au même niveau , apparition d'une ulcération moins profonde mais plus large -
malgré l'antibiothérapie générale et locale, les escarres sont torpides et le
poids est stationnaire.

Une numération montre une anémie à 3.130.000, une 1ère transfusion améliore l'état général, et 2 autres obtiennent la cicatrisation. L'évolution a été de 3 semaines.

Epidémies de crèche :

Parmi les difficultés rencontrées au cours de l'élevage des prématurés, le problème majeur est celui de l'infection.

A la fin de l'année 1958, une épidémie de crèche à colibacille III B₄ sévissait dans le service de Pédiatrie.

Au bout d'un mois seulement les prématurés furent atteints, un seul mourut, un mongolien.

Pendant l'épidémie le service des prématurés fut fermé et 16 enfants adressés au service furent dirigés sur les centres de Paris.

En 1960, il y eut une épidémie de muguet, 11 enfants furent atteints et rapidement guéris par la mycostatine.

- VI -

RESULTATS DE 5 ANS D'ELEVAGE, DE 1957 à 1961

230 entrée , 161 vivants, soit 70% .

Voici réunis dans ce tableau les résultats en fonction du poids.

Poids	entrants	Décédés		vivants	
		Nbre	%	Nbre	%
- 1000	4	3	75	1	25
1000 à 1250	17	14	83	3	17
1250 à 1500	37	17	46	20	54
1500 à 1800	44	11	25	33	75
1800 à 2000	46	10	24	32	76
2000 à 2200	47	19	24	36	76
2200 à 2500	39	3	8	36	92
	230	69	30	161	70

Nous allons entreprendre l'étude analytique de ce tableau.

Moins de 1000 g : 4 enfants dont 3 décès

B... Martine, née le 25.II.57, mère primipare de 18 ans, accouchement normal au terme de 6 mois, PN 935 g. grand prématuré avec entonnoir thoracique, l'élevage est assez facile, au lait de femme, et après la chute de poids l'enfant atteint 795 g. 4 ans après l'enfant est vivante et normale.

Parmi les 3 décès on note :

- 1 - P... Nicole, 910 g. siège complet, terme 6 mois, décédée en quelques heures de troubles respiratoires.
- 2 - P... Natacha, 810 g. terme 6 mois, accouchement à domicile, maintenue au chaud dans du coton hydrophile, décédée quelques heures après son arrivée.

Au total 1 vivant sur 4, normale à l'âge de 4 ans.

De 1000 g à 1250 g : 17 enfants
3 vivants soit 17%

Les 3 survivants:

- 1 - M... Laurence 1140 g jumeau, terme de 7 mois 1/2 élevage facile sauf une anémie traitée par des transfusions.
- 2 - Ch... Dominique 1040 g, terme de 6 mois, chute de poids 140 g. anémie normochrome.
Revue à l'âge de 1 an, l'enfant est hypotrophique et pèse 6 k.210
- 3 - C... Pierre 1170 g accouchement en ville au terme de 6 mois - élevage difficile avec crises de cyanose, météorisme abdominal - anémie.

Sur les 14 décès :

I2 sont survenus dans les 48 premières heures et la rapidité de ces décès ne mettent pas en cause la qualité de l'élevage mais sont imputables à la mortalité quasi inévitable de la période néo-natale. Le tableau est à peu près identique pour tous, qu'il y ait eu réanimation ou non, sur un fond permanent de cyanose se greffent des accès avec apnée de plus en plus prolongée. La respiration artificielle arrive parfois à rétablir une respiration qui reste superficielle et finalement arrive l'apnée décisive.

Deux décès tardifs dont l'un est dû à une épidémie de crèche.

- 1 - T... Eric II40 g. terme de 6 mois, métrorragies par placenta marginal, cyanosé à l'arrivée - élevage assez facile mais à 1 mois I/2 diarrhée à colibacille pathogène III B₄ et malgré l'antibiothérapie adoptée l'enfant meurt.
- 2 - C.. Laurent IO20 g. I4^e enfant, accouchement normal au terme de 6 mois, cri après réanimation. Grand prématuré, respiration périodique, réflexes archaïques présents, puis gémit, rejette des mucosités, le gavage déclenche des crises de cyanose. L'enfant reste fatigué, un peu grisâtre et 3 semaines après la naissance la polypnée s'exagère avec météorisme abdominal, apnée terminale.

Au total, décès retardé d'un prématuré qui dès la naissance avait présenté une détresse respiratoire.

De I250 g à I500 g : 37 enfants, 20 vivants soit : 54%

Parmi les I7 décès, I6 survenus dans les Ières heures ou les premiers jours, mais un enfant est décédé à 5 semaines d'une gastro-entérite infectieuse.

Ch. Richard I360 g, né le I8/9/57, au terme de 6 mois, accouchement laborieux par l'épaule, température 32°5, respiration difficile à s'établir avec apnée et crises convulsives.

Le 29.9 Perte de poids 220 g, diarrhée, aérobacter en quantités abondantes . Décès le 26.X.

Parmi les 20 enfants vivants, 2 ont été revus :

- l'une à 17 mois présente un retard psycho-moteur et staturo-pondéral considérable, ne se tient pas assise, pèse 5 K.650. Revue à l'âge de 3 ans, elle est hospitalisée pour une primo-infection sévère et pèse 6 K, mais les antécédents familiaux sont lourds, la mère est tuberculeuse et éthylique.
- l'autre à 11 mois présente une hypotrophie simple pesant 7 K.560.

De I500 à I800 : 44 enfants, 33 vivants , soit 75%

Parmi les 11 décès, 7 décès dans les 48 premières heures dont 4 par hémorragie méningée vérifiée par ponction lombaire. Parmi les 3 autres :

1 - Un enfant mort au II^e jour de syndrome hémorragique

B... Florence, I000 g accouchement normal au terme de 7 mois, en de suite au 4^e jour météorisme abdominal, réhydratation parentérale - au 8^e jour constipation, hématoméses, purpura, au II^e jour décès dans un tableau d'occlusion avec hématomèse et melaena.

2 - 1 enfant décédé au 4^e jour - apnée et cyanose

3 - un cas d'atrésie de l'oesophage

D... Sylvie, née le II.2.6I , I600 g terme de 8 mois siège complet, mère obèse 43 ans 4^e pare , à l'entrée cyanose, céphalématome pariétal gauche. Le I3 subictère, pétéchiés. La sonde bute à la I^{ère} tentative de gavage. Après absorption de lipiodol, la colonne opaque reste suspendue à 3 cms de l'arcade dentaire, une ponction lombaire faite en raison de l'état de l'enfant ramène un liquide hémorragique. Opéré aux Enfants Assistés, décès le soir même.

- 4 - 1 enfant entre 15 jours après la naissance, prématuré de 7 mois I/2 pesant 1600 g, élevé à domicile, température 28°2, mort au bout de quelques heures.

De 1800 à 2000 g : 42 enfants, 33 vivants, soit 75%

Parmi les décès, 7 dans les 48 premières heures, dont 1 par méningite néo-natale à pneumocoque.

Parmi les 4 décès plus tardifs nous relevons :

- 1 - Un syndrome hémorragique mortel au 4^e jour

D... François, 1900 g, accouchement au terme de 7 mois, placenta praevia, réanimation pendant 6'. A l'entrée, gémit, cyanosé mais la respiration est normale. 3 jours après : pâleur, respiration saccadée, la PL ramène du sang, injection rachidienne de 4/10 de cc d'hydrocortisone, puis hémorragie nasale et buccale - décès.

- 2 - Un enfant mort de pneumonie à l'âge de 1 mois :

L... Lydia 1900 g, terme de 7 mois, siège - au 21 jours selles liquides température 38°, déshydratation, chute de poids, perfusion de solution de Lestradet avec antibiotiques.

Au 22^e jour, polypnée, souffle tubaire gauche, expectoration sanglante où le laboratoire met en évidence le pneumocoque.

Au 25^e jour, polypnée avec battements des ailes du nez, mais disparition du souffle tubaire.

Au 26^e jour, apnées de plus en plus fréquentes - Décès

- 3 - 1 mongolien décédé à 1 mois au cours d'une épidémie de crèche à III B₄.

A... Pascal, 1850 g. né au terme de 7 mois, siège décomplété, cri au bout de 2'. Aspect mongoloïde, pas de malformation cardiaque. Diarrhée à colibacille III B₄ mortelle en 1 semaine.

4 - 1 malformation cardiaque décédé à 2 mois I/2.

H... Dominique, 18.8.59, 1850 g, césarienne pour bassin rétréci. A l'entrée légère cyanose, tachypnée, réflexes archaïques présents.

Le 2I instabilité thermique

Le 22 enfant p , amélioré par O₂ continu

Le 29, les battements cardiaques sont bien visibles, les bruits sont intenses avec souffle systolique méso-cardiaque.

N.F. : 3.600.000 G.R. - l'enfant est mis à la digitaline et le diagnostic de communication interauriculaire paraît probable.

Le 18.9 - en scopie - coeur énorme, débord droit et ventricule gauche atteignant le grill costal. L'enfant se cyanose de plus en plus lors des biberons.

Le 2.I0. souffle systolique à peine perceptible, ébauche de bruit de galop.

Le 13.I0 : escarre sacrée

Le 14.I0: à l'E.C.G. axe droit. Le galop persiste, le souffle a disparu. Fallot probable.

Le 26.I0: cyanose intense prédominant à la moitié supérieure du corps avec dilatation veineuse.

Le 10.II : coeur énorme à la scopie

Le 8.I2 : décès.

De 2000 à 2200 : 47 enfants, 36 vivants, soit 76%

Parmi les 11 décès, 10 sont survenus dans les 48 premières heures.

1 décès à la fin de la 1ère semaine, il s'agissait d'un prématuré avec malformations multiples.

F... Fabienne, 2000 g grossesse normale. Malformations multiples : aplasie du maxillaire inférieur, et rétrognathésie, orifices auditifs externes non perforés, oreilles et yeux de petite taille, pieds et mains bots. Les réflexes archaïques sont présents les bruits du coeur sont normaux, décès dans un tableau d'apnée et de cyanose, l'autopsie ne montre pas d'autres malformations visibles.

De 2200 à 2500 : 39 entrants, 36 vivants soit 92%

3 décès au bout de quelques heures.

LES DECES PRECOCES

69 décès en 5 ans, 55 décès précoces dans les 10 premiers jours soit 79%.

Parmi ces 55 décès précoces, 7 sont morts lors d'un syndrome hémorragique ou d'hypothermie irréversible (transport dans des langes, dans du coton).

Nous allons étudier les 48 autres décès précoces en fonction du terme, du poids et des circonstances de l'accouchement.

En 1957 : 5 décès

2 entre 1000 et 1250 g. T - 6 accouchement N

T - 6 I/2 " "

1 1250 - 1500 g. T ? gemellaire

1 1500 - 1800 g. T. 7 I/2 - siège

1 2000 - 2200 g. T. 7/I/2 - 2è pare. ac. normal

En 1958 : 7 décès

1 moins de 1000 g. - T. 6 - siège complet

1 1000 à 1250 - gemellaire - hychaminios + forceps

3 1250 à 1500 - 6 I/2 - 2è pare - siège

7 - 3è pare - ac. N.

gemellaire 7è pare - réanimation

2 1500 à 2000 g. - 8 - 6è pare - réanimation

1959 : 7 décès

- 2 - 1250 à 1500 - 6 I/2 - 2è pare - réanimation
6 I/2 - métrorragies - Ac. N.
- 3 - 1500 à 1800 - 7 - 8è pare - mère albuminurique - réanimation
césarienne - réanimation
6 I/2 - placenta marginal - liquide méconial
- 1 - 1800 à 2000 - 7 césarienne - placenta pneumo- réanimation
- 1 - 2200 à 2500 - 8 Act. difficile - réanimation

1960 : 13 décès

- 1 - 1000 - ac. N à domicile
- 2 - 1000 à 1250 - 6 - 14è pare - ac. N. réanimation
6 - siège - 2è pare
- 3 - 1250 à 1500 - 6 - 2è pare - métrorragies - césarienne
7 - ac. n.
6 - 3è pare - ac. N.
- 2 - 1500 à 1800 - 7 - 3è pare - ac. à domicile
7 I/2 - 3è pare, placenta marginal - ac. N. réanimation
- 1 - 1800 à 2000 - 7 - 2è pare - ac. N. réanimation
- 2 - 2000 à 2200 - 8 - ac. difficile - réanimation
7 - 2è pare - ac. N.- hématome rétro-placentaire
- 2 - 2200 à 2500 - 8 I/4 - 4è pare - hydramnios - ac. N.
8 - 2è pare - ac. à domicile

1961 : 16 décès

- 6 - 1000 à 1250 - 6 I/2 - prééclampsie - césarienne
gemellaire
6 I/2 1è pare - ac. rapide
6 - 3è pare - siège décompleté
T gemellaire
6 I/2 - 3è - mort apparente
6 - Siège

- 3 - I500 à I800 - 7 - I^{er} pare - pyélonéphrite gravidique
7 I/2 - 2^e pare - ac. N.
Gemellaire IV
- 2 - I800 à 2000 - grossesse et accouchement cachés
7 - I^e pare - métrorragies - siège -
- 1 - 2000 à 2200 - 7 I/2 - 5 pare - césarienne pour placenta praevia.

CIRCONSTANCES ETIOLOGIQUES DES DECES PRECOCES :

- 7 présentation du siège
- 2 hydramnios
- 8 gemellaire
- 2 métrorragie
- 4 insertion vicieuse du placenta
- 2 césarienne
- 1 rupture prématurée des membranes
- 3 maladie gravidique
- 1 pyélonéphrite
- 7 réanimation

9 accouchements dit normaux, soit 18% des décès précoces. Sur ces 9 accouchements, aucun ne dépasse le terme de 7 mois I/2, il semble donc que la prématurité seule soit responsable du décès de ces enfants.

CAUSES DE LA MORT :

Il est à déplorer que les circonstances locales aient empêché jusqu'ici de pratiquer des autopsies. Néanmoins le tableau clinique suffisamment net permet de classer les causes du décès de la façon suivante:

- hémorragie méningée
- troubles respiratoire
- syndrome hémorragique
- hypothermie

LES RECES TARDIFS

Ce sont les décès survenus au delà de la période critique néo-natale du 10^e jour, ils représentent la mortalité "d'élevage", c'est à dire le retentissement de l'infection:

sur 69 décès ,14 décès tardifs.

En réalité, il ny a que 13 décès tardifs puisqu'un enfant mort à l'âge de 15 jours n'a vécu que quelques heures dans le service.

Parmi les 13 décès tardifs :

3 décès de troubles respiratoires au 11^e jour

2 décès hémorragie méningée au 12^e jour

1 décès occlusion plus syndrome hémorragique au 11^e jour.

1 décès apnée à 21 jours, étiologie inconnue

4 décès épidémies de crèche

1 décès pneumonie à 27 jours

1 malformation cardiaque

On peut remarquer le petit nombre de décès par complications infectieuses, 4 sur 14 décès tardifs.

1 - Diarrhée à aerobacter :

C... Richard, né le 18.9.57, au terme de 6 mois, 1360 g. accouchement laborieux par l'épaule, réanimation.

A l'entrée température 32°5, respiration difficile , oedème, hématomes des membres supérieurs - ensuite apnée, crises convulsives, réanimation artificielle - le 23.X. selles molles - perd 220 g. à la coproculture, aerobacter
Décès le 26.

2 - Diarrhée à colibacille III B₄

A... Pascal - né le 26.XI.58, terme 7 mois - siège décomplété - cri au bout de 2 minutes - P 1850 g - mongolien - le 19.I2 diarrhée à colibacille III B₄ - décédé le 12.I. - P. 1220 g.

3 - Diarrhée

Le germe responsable n'est pas mis en évidence par la coproculture mais à ce moment sévissait l'épidémie à colibacille III B₄.

T... Eric, 1140 g., terme de 6 mois, métrorragies pour placenta praevia. A l'arrivée cyanose - Le 18.2. vomissements selles molles - décès le 22.2

4 - Diarrhée germe non identifié

Enfant mort à l'âge de 1 mois

Comparaison avec les résultats obtenus par d'autres centres de prématurés.

ECOLE DE PUERICULTURE

24% de décès

NANTES : 894 entrées

300. décès soit 36%

156 décès précoces soit 17%

BOURGES : 571 entrées

66 décès soit 11,6 M

57 décès précoces soit 10%

STRASBOURG - de 1952 à 1956

789 entrées

178 décès soit 22%

169 décès précoces soit 21%

FONTAINEBLEAU :

230 entrées

69 décès soit 30%

55 décès précoces soit 23%

oOo

. TABLEAUX RECAPITULATIFS

DE 5 ANNEES D'ELEVAGE DE PREMATURES A FONTAINEBLEAU

ooo

Catégorie de Poids	Nbre	Vivants %	Parité	Terme	Grossesse-Accouchem.	Poids Sexe	Lait	Elevage - Incidents Résultats
de 1000	1	100%	I	6	- Acc. normal	935 ♀	LM	- Infection pulmonaire. Anémie hypochrome
1000 à 1250	2	0 %		6 6 1/2	- Acc. normal	1210 ♂ ♂		- D.C.D. 24h. tr. respirat. - D.C.D. 1 h. tr. respirat.
1250 à 1500	5	40%	III III	7 1/2 7 6	- Acc. normal - Acc. normal- Ethylisme + Tuberculose - 2 prématurés dans les antécédents - Présentation épaule - Gemellaire - jumeau de D arrivée	1300 ♂ 1340 ♀ 1360 ♀ 1360 ♂ 1420 ♀	LM AL	- D.C.D. Tr. Respir. 11 j - Retard psychomoteur et pondéral. - à 1 an. p. 7560 g. - D.C.D. à 5 semaines occlusion - aërobacter - D.C.D. 3 h après l'arrivée
1500 à 1800	4	75%	II	7 1/2 7 1/2 8 1/2	- Siège - Gemellaire - Gemellaire	1550 ♀ 1690 ♀ 1780 ♂ 1780 ♀	LM-AL AL	- D.C.D. - hémorragie méningée. 4 jours - Elevage facile - Elevage facile - Elevage facile
1800 à 2000	5	80%	I II	8 8 6 1/2	- Césarienne - placenta prævia - Siège	1780 ♂ 1900 ♂ 1940 ♂ 1980 ♀ 1980 ♀	LM - AL LM LM LM	- Elevage facile - D.C.D. 11 jour. Tr. resp. - Né étonné - Elevage facile - Elevage facile
2000 à 2200	3	60	II	8 7 1/2 7 1/2	- Grossesse gemellaire	2000 ♂ 2100 ♀ 2000 ♂	AL AL	- Arrivé 15 jours après naissance - Elevage facile - DCD. Quelques heures
2200 à 2500	9	100		7 1/2 7 7 1/2 8 7 1/2 7 1/2 8 8 8	- 2 prématurés + 1 Fc - Accouch. normal - Présentation face - Accouch. normal - Accouch. normal - Accouch. normal - Accouch. normal	2200 ♀ 2200 ♂ 2280 ♀ 2430 ♀ 2200 ♂ 2280 ♂ 2250 ♀ 2280 ♀ 2300 ♂	AL AL AL AL AL AL+LM AL AL AL	- DCD. Tr. Respir. 24 h - Elevage facile - Elevage facile - Elevage facile - Elevage facile - Elevage facile - Elevage facile -
1957								

Catégorie de poids	Nbre	Vivants %	Parité	Termes	Grossesse-Accouch.	Poids Sexe	Lait	Elevage - Incidents Résultats
- 1000	1	0		6	- Siège complet	910 ♀		- DCD 24 h. tr. respirat.
1000 à 1250	3	33	III	6 6	- Placenta bas situé - hémorragie - Gemellaire - hydramnios - forceps	1040 ♀ 1140 ♂ 1160 ♀		- Revue à 1 an P.6210 g - Epidémie 111 B4, DCD 2 mois. - Hernie ombilicale DCD 4 jours.
1250 à 1500	12	58	II II III XVII XVII I	6 1/2 6 1/2 6 3/4 6 3/4 7 7 7 1/2 7 8	- Siège - Accouch. normal - Siège, menace F.C. au 3ème mois - Accouch. normal - Gemellaire - Gemellaire - Réanimat. - Hypertension, forceps - Siège - Accouch. normal - Accouch. normal	1280 1350 ♀ 1360 ♂ 1380 ♂ 1400 ♀ 1290 ♀ 1400 ♀ 1460 ♂ 1430 ♂ 1450 ♀ 1450 ♀ 1460 ♂	LM LM+AL LM+AL AL LM+AL	- Hémorragie méningée DCD 24 h - cyanose - DCD 24 h. - DCD, quelques heures - DCD 1 heure - DCD 4 heures - Epidémie de crèche 111 B4
1500 à 1800	8	87	I III	7 7 7 7 1/2 8	- Gemellaire - Accouch. normal - Accouch. normal - Hydramnios aigu, siège gemellaire - Accouch. rapide	1550 ♀ 1625 ♀ 1635 ♀ 1715 ♂ 1760 ♀ 1780 ♂ 1700 ♂ 1740 ♀	AL LF+AL AL LM LF AL	- Epidémie 111 B4 - Revu à 3 ans, chétif
1800 à 2000	10	70	XVII II VI I	7 7 7 8 7 8 1/2	- Gemellaire - réanimat. - Césarienne - bassin limité - Siège complet, crie au bout de 2' - Accouchement normal - Accouchement normal - 4 préma, dont 3 DCD cri faible - Accouchement normal - Accouchement normal - Accouchement normal	1800 ♀ 1820 ♂ 1850 ♂ 1850 ♂ 1870 ♂ 1880 ♀ 1950 ♀ 1930 ♀ 1960 ♀ 1980 ♀	LM+AL AL	- cyanose, apnée, DCD en quelques heures - DCD 2 mois 1/2, mal- formation cardiaque - mongolien - DCD 2 mois 111 B4 - 1 crise convulsive - DCD 7 heures, apnée - Elevage facile - Elevage facile - Elevage facile
2000 à 2200	6	83	IV VI II	8 7 7 1/2 7	- Rupture de la poche des eaux, 48 h. - Gemellaire, l'autre DCD - Spasme du col, crie au bout de 3' - Accouchement normal - Accouchement normal - Siège	2000 ♂ 2070 ♂ 2080 ♂ 2100 ♂ 2120 ♀	AL	- DCD 24 h. syndrome hémorragique - Hémorragie méningée - Sclérose - hypother- mie.
2200 à 2500	1				- Accouchement normal	2390 ♂		- Elevage facile

Catégorie de poids	Nbre	Vivants	Parité	Terme	Grossesse-Accouchem.	Poids Sexe	Lait	Elevage - incidents résultats
- 1000						810 ♀		- DCD au bout de 2 heures
1000 à 1200	0							
1250 à 1500	3	33	II VI	6 1/2 6 1/2	- Accouch. rapide, réanimation - Métrorragies. Acc. N. - Accouchement normal	1250 ♂ 1435 ♀ 1470 ♂	AL	- Apnée - DCD 8 heures - Syndrome hémorragique DCD
1500 à 1800	9	70	II VIII II XI II	6 1/2 6 1/2 7 7 1/2 7 1/2 6 2/3 7 1/2	- Rupture poche eaux depuis 15 jours. réanimation - Mère albuminurique, réanimation 1/4 d'h. - Réanimation après césarienne - Circulaire du cordon - Siège - accouch. normal - Accouchement normal - Accouchement normal - Placenta marginal. Accouch. normal - Accouch. normal	1520 ♂ 1560 ♂ 1540 ♀ 1600 ♂ 1645 ♂ 1670 ♀ 1670 ♀ 1700 1720 ♂	LM AL AL AL AL AL	- Revue à 11 mois; P. 8080 - Cyanose, DCD 3 heures - DCD 6 h. - Hem. Méning. DCD 24h.
1800 à 2000	8	87	III II	7 7 1/2 7 8 8 8	- Césarienne pour placenta praevia réanim. - Accouchement normal - Accouchement normal - Gemellaire - Gemellaire - Césarienne	1810 1830 ♀ 1860 ♀ 1880 ♀ 1890 ♀ 1900 ♂ 1960 ♀ 1960 ♂	AL AL Alma Alma AL AL	- Tr. Respiratoires DCD 5 h. - Otite
2000 à 2200			III IV	8 7 7 1/2 8 8 7 1/2 7 1/2 8	- 1 F.C. 2 mois 1/2, gemellaire - Accouch. normal gemellaire - Accouch. normal - Gemellaire - Accouch. normal - Gemellaire - Siège - Forceps - réanimat. - Tentatives d'infantic. - Césarienne	2000 ♀ 2050 ♂ 2050 ♀ 2100 ♂ 2150 ♀ 2120 ♂ 2020 ♂ 2010 ♂ 2150 ♀ 2050 ♀ 2070 ♀ 2190 ♂ 2190 ♀	Alma LM AL AL LM AL/LM AL AL	- Tr. respir. DCD 4 j. - Hem. Méning. DCD 24 h. - Entre à 20 jours pour syndrome toxique - Diarrhée - Muguet - Tr. Respirat. à 13 m. 9140 g. - Tr. respir. DCD quelques heures
2200 à 2500			III IV I III III II	7 1/2 3 8 8 8 1/2 8 1/2 8 7 1/2 8	- Accouchement normal - Accouchement norm. - 1 praevia DCD, acc. normal - Acc. difficile, réanim - Acc. normal - Acc. rapide - Accouch. normal - Mère albuminurique - Accouch. normal - Accouch. normal - Acc. rapide	2200 ♂ 2220 ♂ 2200 ♂ 2300 ♀ 2300 ♂ 2300 ♂ 2370 ♂ 2370 ♂ 2380 ♀ 2390 ♂ 2390 ♂ 2430 ♀ 2490	LM AL AL AL AL LM AL AL LM AL AL AL	- Anoxie, DCD quelques heures - Hem. méning. à 15 m. retard psycho-moteur. - Tr. respir. lymphangiome - Ictère physio. intense

Catégorie de poids	Nbre	Vivants	Parité	Terme	Grossesse, Accouch.	Poids Sexe	Lait	Rivage - Incidents Résultats
1000	9	11 %	I I III III	6 1/2	- Prééclampsie, césarienne. - Grossesse gemellaire	1230 ♀ 1180 ♀ 1000 1140 1170 1200 1170	Aleté	- Tr. respir. DCD 6 h. - Hem. méningée, DCD 3 h. - DCD, 1 h. - DCD, 24 h. - anémie transfusions - Tr. respirat. DCD 6h - Hémor. méningée DCD 1 h - DCD 11 h. - Hem. méningée DCD 2 h 30
a				6 1/2	- Acc. normal rapide - Acc. normal domicile - Siègle décompleté - Acc. gemellaire	1170 1200 1170		
1250				6 1/2	- Etat de mort apparente - Siègle	1100 1140		
				6				
				8				
1250	9	55	II VII V VI	8	- Gemellaire	1270	AL	- Hem. méning. DCD 4 h
				7 1/2	- Acc. normal	1460		- Muguet
				8	- Acc. normal	1460		- Anémie transfusion
a				6	- hydramnios, réanim.	1400		- DCD 3 h
				6 1/2	- Prééclampsie, sommet	1350		- Muguet, anémie, transfusion
	9	55	VI	6 1/2	- siègle décompleté, souffrance foetale	1300	AL	- Anémie, transfusion
				6 1/2	- Rupture prématurée des membranes	1400		- DCD 3 h
1500				7 1/2	- Siègle décompleté	1400		- Bon élevage
				6	- Siègle	1260		- Hypothermie DCD 4 h.
1500	13	61	I III III II IV	7	- Pyélonéphrite - Grossesse gemellaire	1750 1680 1600 1770	AL	- Tr. respir. DCD 12 h
				7 1/2		1700		- Tr. respir. DCD
				7 1/2	- Acc. normal	1700		- Anémie transfusions
a				8	- Mère albuminurique	1630		- Ictère transfusions
				8	- Siègle complet	1600		- Atresie oesophage DCD
	13	61	III	7		1600	AL	- Occlusion, hémorragies DCD 11 jours
				7 1/2	- Acc. normal	1780		- Hem. méning. DCD 1 h
				7 1/2	- Acc. gemellaire	1730		- Hypothermie, Sclereme DCD
1800				7	- Rupture prématurée des membranes	1550		- Diarrhée, S5 B5, perfusion
				6 1/2	- Acc. normal	1600	Eledon	- Escarres, diarrhée
				7 1/2	- Acc. normal	1760		-
1800	9	66	IV I I I V	7	- Acc. gemellaire	1980	AL	- Hypothermie, sclereme
				7	- hydramnios, utérus bifide	1850		- Syndrome hémorragique
				8	- Acc. normal, 4 circulaires	1860		- Méningite néo-natale DCD 20 h.
a				7	- Grossesse et accouch. cachés	1850		- Tr. Respir. DCD 4 h
				7	- Métorrhagies, siègle, pendant le trajet	1800 1820		- Tr. respir. DCD 6 h
	9	66	I I I V	7 1/2	- Acc. normal	1920	AL	- Hem. méning. anémie
				8 1/2	- Acc. provoqué, facteur Rhésus	1870		- Muguet
2000						1820		
2000	10	80	II IX V III V	8	- Acc. normal	2180	AL	- Diarrhée 55 B5
				7 3/4	- Acc. normal	2080		- Hem. méningée DCD 8 h.
a				7 1/2	- Souffrance foetale, Réanimation	2100		
				7 1/2	- Césarienne, placenta praevia	2100		
				8	- Placenta praevia	2140		
	10	80	III V	7 1/2	- Rupture prématurée, poche des eaux	2000	LM	- Ictère, gros foie
2200				7 1/2	- Grossesse gemellaire	2000		- DCD, quelques heures
						2170		
						2020		
2200	11	100	III	9	- Souffrance foetale, circulaire	2240	LM	- Bec de lièvre
				8	- Siègle complet	2230		- Hemor. Méningée.
a				7 1/2	- Acc. normal	2965		
				7	- Réanimation	2400		
				7 1/2	- Face forceps	2400		
	11	100	I	7	- Placenta praevia	2350	AL	
				7	- Acc. normal	2220		
2500				8	- Né étonné	2230		
					- Gemellaire, césarienne albumine	2400		
1961						2400		

CONCLUSIONS TIREES DE CES TABLEAUX

Sur un élevage de 230 enfants :

Accouchements jumeaux	32
normaux	98
Sexe - filles	109
Allaitement maternel	23 - 10%
Élevage facile	103

Incidents d'élevage :

- diarrhées infectieuses	14
- muguet	15
- anémie	9

C O N C L U S I O N S

Le problème de l'élevage des prématurés, s'il est résolu de manière plutôt satisfaisante dans les grands centres régionaux, reste encore difficile à résoudre dans les centres de pédiatrie qui ne bénéficient pas d'une installation spécialisée.

Cependant dans ces conditions, des dispositions spéciales : affectation des locaux isolés, installation appropriée, formation d'un personnel bien entraîné, permettent de faire face aux exigences particulières des prématurés de faible poids.

Les résultats observés dans un centre comme celui de Fontainebleau montrent qu'ainsi organisé, un tel centre peut fonctionner de façon satisfaisante.

En effet, l'étude de la mortalité des prématurés de ce centre montre que :

- la mortalité globale, 30% rejoint les chiffres finalement donnés qui sont de 24%,

- la mortalité "d'élevage", c'est à dire la mortalité au-delà du dixième jour, mortalité qui traduit le retentissement de l'infection, est très faible, soit 2% ce qui prouve la qualité des soins donnés.

A condition de respecter les règles essentielles qu'exige l'élevage des prématurés : direction par un pédiatre qualifié, isolement des locaux, qualification du personnel (puéricultrice diplômée d'état), mise en oeuvre d'une technique de soins aseptiques sans défaillance, le centre de Prématurés de Fontainebleau, installé dans une ville de 20.000 habitants, drainant la population de Seine et Marne et d'une partie du Loiret, a fonctionné d'une façon très efficace. Il constitue un élément essentiel de la lutte contre la mortalité infantile et permet ainsi d'attendre la construction prochaine d'un véritable centre de Prématurés.

Vu, le Président de Thèse :
Professeur M. LELONG

Vu, le Doyen de la Faculté :
Professeur L. BINET

Vu, et permis d'imprimer
Le Recteur de l'Académie de Paris
J. ROCHE

B I B L I O G R A P H I E

CROSSE M. - The premature baby (1 vol. - 2^e édition 1949)

LELONG M., ROSSIER A., MICHELIN J. , GASENEL H. -

Le lait de femme dans l'alimentation du prématuré
(Bul. Acad. de Médecine 1950)

LELONG M., ROSSIER A., MICHELIN J. -

La notion calorique globale du prématuré : ses rapports avec la
thermo-régulation (Arch. Française de Pédiatrie - 1949.6.113.129)

LELONG M. et collaborateurs -

Les prématurés - Sem. des Hôp. Paris. n° spécial 1951

REBADEAU, DUMAS (L) et LATASIE -

Les nourrissons débiles et prématurés (1 vol. 104 p. Paris
1935 - Masson)

HESS J.H. et LUNDEEN E.C. -

The premature infant : its medical and nursing care (1 vol. 279
p. Philadelphie - 1950)

ROSSIER A. - EM.C. Pédiatrie I , n° 40002 - 510 à 560

DEBRE - LELONG - Pédiatrie - Flammarion - Tome I - chapitre V

Médecine Infantile - n° spécial consacré à la prématurité - octobre 1959, n° 8

RULLIERE - Avenir immédiat des prématurés dans une maternité hospitalière -
Thèse Lyon 1957.

CHABOT - L'avenir du prématuré d'après 894 enfants passés au centre de
prématurés de Nantes. Thèse Paris 1956


RAKOTONDRAINIKE H. - Acuité et résultats d'un centre de prématurés - Thèse
Paris 1960

LAUREE - Considérations sur l'organisation et le fonctionnement d'un centre
moderne d'élevage de prématurés. Thèse Toulouse 1953

BRUNEHU O. - Le centre de prématurés de l'hôpital des enfants de Bordeaux
Thèse Bordeaux 1958

GUYOT-THILLIER O. - Contribution à l'étude de l'élevage des prématurés -
Thèse Paris 1956

DAHI A. - Traitement et protection du prématuré.



**AGEMP
POLYCOPIE**

8, rue Dante
PARIS - V •

Téléphone : ODÉon 58-96